

Schädel-Hirn-Trauma (SHT) / Prellungen

Was ist der Unterschied?

Kopfverletzungen sind im Kindesalter häufig – besonders beim Spielen, Klettern oder bei Stürzen. Dabei kann es zu einer einfachen Prellung (Beule) oder zu einem Schädel-Hirn-Trauma (SHT) kommen. Während Prellungen meist harmlos sind, kann ein SHT das Gehirn betreffen und sollte beobachtet werden. Die meisten SHT im Kindesalter verlaufen zum Glück leicht.

Was ist ein SHT?

Kopfverletzung durch Sturz oder Schlag. Leichtes SHT meist mit kurzer Reaktion des Kindes, ohne bleibende Symptome.

Was tun bei leichter Prellung?

- Beobachten, Kind darf schlafen
- Nur bei normalem Verhalten keine weitere Massnahme nötig

Wann zum Arzt?

- Bewusstlosigkeit
- Erbrechen, starke Kopfschmerzen
- Wesensveränderung, Schläfrigkeit
- Auffälliger Gang, Verwirrtheit

In der Praxis:

Neurologische Untersuchung, ggf. Überweisung ins Spital zur Bildgebung oder Überwachung

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Ihr Kinderarzthaus